

ГБОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГУП «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ФАРМАЦИЯ»

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель министра
здравоохранения

Республики Татарстан

Ф.Ф.Яркаева

29.02.15 2015 год

«СОГЛАСОВАНО»

Министр здравоохранения
Республики Татарстан

А.Ю.Вафин

29.02.15 2015 год



Методические рекомендации
по применению в практической деятельности медицинских
организаций Республики Татарстан унифицированных прописей
лекарственных препаратов аптечного изготовления

Казань, 2015

УДК 615.45

ББК 52.82

Согласовано:

Главный внештатный специалист - терапевт МЗ РТ И.Н.Сафин
 Главный внештатный специалист МЗ РТ по акушерству и гинекологии И.Р.Галимова
 Главный внештатный специалист - хирург МЗ РТ А.Ю.Анисимов
 Главный внештатный специалист - офтальмолог МЗ РТ А.Н.Амиров
 Главный внештатный специалист - травматолог МЗ РТ С.В.Кривошапко
 Главный внештатный специалист - стоматолог МЗ РТ Н.И.Шаймиева
 Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» Л.И.Басанова

Составители:

С.Н.Егорова, заведующая кафедрой фармации ФПКипПС ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор фармацевтических наук, профессор;
 А.О.Пологов, начальник Управления по фармации МЗ РТ;
 М.В.Терентьева, ведущий консультант отдела регулирования в сфере обращения лекарственных средств Управления по фармации МЗ РТ;
 О.З.Акберов, генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм»;
 О.В.Галихина, начальник Управления аптечной сетью ГУП «Таттехмедфарм», кандидат фармацевтических наук;
 М.Г.Елисеева, начальник отдела регулирования аптечной деятельностью ГУП «Таттехмедфарм»;
 И.В.Безрукина, главный специалист отдела регулирования аптечной деятельностью ГУП «Таттехмедфарм»;
 З.М.Галеева, заведующая аптекой №361 ГУП «Таттехмедфарм»;
 В.Г.Киселева, провизор-аналитик аптеки №361 ГУП «Таттехмедфарм»;
 Х.Р.Мардаханова, заведующая аптекой №293 ГУП «Таттехмедфарм»;
 Н.С. Калашникова, провизор-аналитик аптеки №293 ГУП «Таттехмедфарм»;

Методические указания по применению в практической деятельности медицинских организаций Республики Татарстан унифицированных прописей лекарственных препаратов аптечного изготовления /С.Н. Егорова, А.О.Пологов, М.В.Терентьева, О.З.Акберов, О.В.Галихина, М.Г.Елисеева, И.В.Безрукина, З.М.Галеева, В.Г.Киселева, Х.Р.Мардаханова, Н.С. Калашникова. – Казань: Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 2015.- 52 с.

Методические указания предназначены для использования в практической деятельности медицинских организаций. Представлено обоснование использования экстенпоральных лекарственных форм в различных областях медицины, приведены составы лекарственных форм, указано их применение и сроки годности. Методические указания предназначены для врачей и медицинских сестер.

©Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Введение. Аптечное изготовление лекарственных форм является необходимым звеном современной системы лекарственного обеспечения, поскольку позволяет удовлетворить потребности здравоохранения в лекарственных препаратах, не имеющих промышленных аналогов, обеспечить индивидуальное дозирование лекарственных препаратов, а также изготовить лекарственные формы без консервантов и других неиндифферентных добавок.

Следует отметить, что в состав лекарственных препаратов входят фармацевтические субстанции, обеспечивающие фармакотерапевтическое действие, и вспомогательные вещества: растворители, мазевые основы, консерванты, стабилизаторы и др. В ряде случаев вспомогательные вещества ограничивают область применения лекарственных препаратов. Состав и технология производства лекарственных препаратов различаются в зависимости от пути введения лекарственной формы. Так, раствор глюкозы 5% для инъекций не может быть использован вместо раствора глюкозы 5% для внутреннего применения новорожденным вследствие наличия в его составе кислоты хлористоводородной и кислого значения pH; поэтому стерильные растворы глюкозы для допаивания новорожденных, не содержащие стабилизаторов, консервантов и других добавок, изготавливаются в аптеке. Раствор новокаина 0,5% для инъекций промышленного производства не может быть использован для электрофореза, поскольку содержит неиндифферентный стабилизатор (для предотвращения гидролиза при стерилизации) – кислоту хлористоводородную; для электрофореза используются растворы аптечного изготовления, не содержащие добавок вспомогательных веществ («паразитарных ионов»), и т.д.

Способ применения лекарственных препаратов промышленного производства указывается производителем в Инструкции по применению, являющейся правовой основой для их назначения. Поэтому **НЕДОПУСТИМО** нарушение регламентированного способа применения лекарственных препаратов, например, использование инъекционных растворов

в ампулах (воды для инъекций, инъекционных растворов натрия хлорида, глюкозы, кислоты аскорбиновой, димедрола и др.) для внутреннего применения, для закапывания в глаза и в нос, для электрофореза и т.п. – как из-за опасности травмирования осколками стекла, так и вследствие различий в составе ряда лекарственных препаратов, и др.

Согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» к аптечному изготовлению лекарственных препаратов (Статья 56. «Изготовление и отпуск лекарственных препаратов»): «Изготовление лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, осуществляется по рецептам на лекарственные препараты, по требованиям медицинских организаций, ветеринарных организаций в соответствии с правилами изготовления и отпуска лекарственных препаратов, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Это означает **НЕДОПУСТИМОСТЬ** расфасовки/ переливания/ взвешивания/ разведения/ растворения лекарственных препаратов и проведения других технологических операций медицинским персоналом в отделениях медицинских организаций.

Вышеизложенное обуславливает необходимость обеспечения медицинских организаций лекарственными формами аптечного изготовления. В Республике Татарстан аптечное изготовление лекарственных форм осуществляется в аптеках ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

В настоящих Методических указаниях приведены прописи лекарственных препаратов аптечного изготовления, не имеющие промышленных аналогов по составу, виду упаковки, дозировке и концентрации, необходимые для обеспечения лечебного процесса в различных областях медицины и наиболее часто используемые в медицинской практике; однако данный список не является закрытым.

Для удобства использования прописи представлены как по направлениям медицинской деятельности (Часть I), так и по видам лекарственных форм (в сводной таблице – Часть II).

**Часть I. Прописи лекарственных препаратов аптечного изготовления
по направлениям медицинской деятельности**

**1. ПЕДИАТРИЯ, НЕОНАТОЛОГИЯ. Специальные составы
лекарственных форм аптечного изготовления для детей**

1.1. Растворы, масла для наружного применения

1. **Вода очищенная** стерильная (для обработки глаз новорожденных)
- 10,0
2. **Вода очищенная** стерильная (для обработки эндоскопов, аппарата искусственной вентиляции легких, кювезов новорожденных) - 50,0; 100,0; 150,0; 180,0; 200,0; 400,0
3. **Водорода перекиси** раствор для обработки пуповины новорожденных 3% - 8,0 (10,0) (асептически)
4. **Водорода перекиси** раствор 3% - 60,0, 220,0, 400,0 (для детей, без стабилизатора)
5. **Глицерин** 10,0 стерильный (для смазывания оливы при дуоденальном зондировании)
6. **Масло вазелиновое** 5,0 (10,0) стерильно
7. **Масло вазелиновое** 25,0 (30,0, 50,0) стерильно
8. **Натрия гидрокарбоната** раствор стерильный 3% - 100,0 (для обработки кожи новорожденных)
9. **Натрия хлорида** раствор для клизм 1% (2%; 3%) -200,0
10. **Натрия хлорида** раствор для клизм 4,5% (5%) - 100,0
11. **Натрия хлорида** раствор стерильный 3% - 50,0; 100,0 (для клизм)
12. **Натрия хлорида** раствор стерильный 4,5% (5%) - 100,0 (для клизм, для перевязок)

1.2. Стерильные растворы для внутреннего применения

1. **Вода очищенная** стерильная - 10,0 (для допаивания новорожденных)
2. **Вода очищенная** стерильная - 100,0; 200,0 (для разведения сухой смеси для детского питания)
3. **Глюкозы** раствор стерильный 5% (25%) - 10,0 (для допаивания новорожденных)
4. **Магния сульфата** раствор стерильный 12,5% - 50,0 (для дюбажа)
5. **Магния сульфата** раствор стерильный 25% (33%) -100,0; 200,0; 400,0 (для дуоденального зондирования)
6. **Эуфиллина** раствор стерильный 0,5%- 50,0

1.3. Растворы, микстуры для внутреннего применения

1. **Кальция хлорида** раствор 5% - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
2. **Кислоты аскорбиновой** раствор 1% - 50,0; 100,0; 200,0
3. **Магния сульфата** раствор 2% (5%) – 100,0; 200,0; 400,0
4. **Магния сульфата** раствор для дюбажа 12,5% - 200,0
5. **Натрия хлорида** раствор 1%-200,0
6. **Микстура:**
 Раствора глюкозы 10%-200,0
 Магния сульфата 2,0
 Настойки валерианы 2,0
7. **Микстура:**
 Раствора глюкозы 4%-200,0
 Тиамин хлорида
 Пиридоксина гидрохлорида поровну по 0,04
 Кислоты аскорбиновой 2,0
8. **Микстура:**
 Раствора глюкозы 4%-200,0
 Рибофлавина
 Тиамин хлорида поровну по 0,02
 Кислоты аскорбиновой 2,0

9. **Микстура отхаркивающая:**

Экстракта корней алтея 2,0
Натрия гидрокарбоната 3,0
Воды очищенной 100,0

10. **Микстура отхаркивающая:**

Экстракта корней алтея 6,0
Натрия гидрокарбоната 3,0
Воды очищенной 300,0

11. **Микстура отхаркивающая:**

Экстракта корней алтея
Натрия гидрокарбоната
Натрия бензоата
Нашатырно-анисовых капель
Грудного эликсира поровну по 2,0 (4,0)
Воды очищенной 100,0 (200,0)

12. **Микстура отхаркивающая:**

Экстракта корней алтея
Натрия гидрокарбоната
Натрия бензоата
Грудного эликсира поровну по 2,0 (4,0)
Воды очищенной 200,0

1.4. Порошки

1. **Дибазола** 0,001 (0,002)
Глюкозы 0,2
№50

2. **Кальция глюконата** 0,2 №30

3. **Кислоты аскорбиновой** 0,01 (0,05)
Глюкозы 0,2
№30 (№25, №50)

4. **Кислоты фолиевой** 0,00005
Глюкозы 0,2
№50

5. **Кофеина-бензоата натрия** 0,2 №30

6. **Пиридоксина гидрохлорида** 0,01
Глюкозы 0,2
 №30

7. **Фенобарбитала** 0,003 (0,005)
Глюкозы 0,2
 №20 (№30; №50; №60; №120)

8. **Эуфиллина** 0,005
Кальция глюконата 0,2
 №30

9. **Порошки «Антигриппин» детские:**
 Димедрола 0,01
 Анальгина 0,2
 Кислоты аскорбиновой 0,1
 Глюкозы 0,2
 № 10

10. **Порошки «Антигриппин» детские:**
 Димедрола 0,005
 Анальгина 0,02
 Кальция глюконата
 Кислоты аскорбиновой поровну по 0,05
 Глюкозы 0,1 (0,2)
 №10

11. **Порошки «Антигриппин» детские:**
 Димедрола 0,005
 Рутина 0,01
 Анальгина 0,02
 Кальция глюконата
 Кислоты аскорбиновой поровну по 0,1
 №20

2. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Лекарственные формы для глаз

1. **Вода очищенная** стерильная (для обработки глаз, в т.ч. у новорожденных) - 10,0
2. **Водорода перекиси** раствор 6%-200,0 (для обработки камер Ультралайт) – изготовлено асептически

3. **Глюкозы** раствор 20% стерильный (для ванночек) – 10,0 (50,0; 100,0)
4. **Кислоты борной** раствор стерильный для промывания глаз 2% - 10,0; 100,0
5. **Калия йодида** раствор стерильный 3% - 10,0 (глазные капли)
6. **Калия перманганата** раствор 1:8000 (асептически, для обработки глаз) -30,0; 50,0
7. **Кальция хлорида** раствор стерильный 3% - 10,0 (глазные капли)
8. **Краска для тонометрии:**
Колларгола 2,0
Воды очищенной 30 капель
Глицерина 30 капель
9. **Краска для тонометрии:**
Колларгола 1,0 (2,0; 5,0)
Воды очищенной 10 (20; 50) капель
Глицерина 10 (20; 50) капель
9. **Колларгола** раствор 2% - 10,0 (глазные капли)
10. **Натрия хлорида** раствор стерильный 0,9% - 10,0 (для обработки глаз)
11. **Натрия хлорида** раствор стерильный 10% - 10,0 (для обработки глаз)
12. **Рибофлавина** раствор стерильный 0,02% - 10,0 (глазные капли)
Рибофлавина 0,002
Натрия хлорида 0,09
Воды очищенной до 10,0
13. **Хлоргексидина биглюконата** раствор 0,02% стерильный – 10,0 (для обработки век)
14. **Фурацилина** раствор стерильный 0,02% (глазные капли)
Фурацилина 0,002
Натрия хлорида 0,085
Воды очищенной до 10,0
15. **«Витаминные»** глазные капли
Раствора рибофлавина 0,02%-10,0
Кислоты аскорбиновой 0,02
Натрия хлорида 0,05
Глюкозы 0,2
16. **Раствор для обработки контактных линз**
Натрия тиосульфата раствор 3%-200,0

3. ФИЗИОТЕРАПИЯ

Растворы для электрофореза, компрессов и ингаляций

1. **Дибазола** раствор для электрофореза 1%-200,0
2. **Димедрола** раствор для электрофореза 0,5% (1%) – 30,0; 50,0; 200,0
3. **Раствор для компрессов**
Димексида 25,0
Воды очищенной 100,0
4. **Ихтиола** раствор для электрофореза 5%-200,0
5. **Калия йодида** раствор для электрофореза 1% (2%; 3%; 5%) – 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
6. **Кальция хлорида** раствор для электрофореза 1% (5%) - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
7. **Кислоты аскорбиновой** раствор для электрофореза 1% (2%; 5%) - 50,0; 100,0; 200,0
8. **Кислоты никотиновой** раствор для электрофореза 1%-50,0 ; 100,0 ; 200,0; 250,0; 400,0
9. **Кофеина-бензоата натрия** раствор для электрофореза 1% - 50,0; 100,0; 200,0; 400,0
10. **Магния сульфата** раствор для электрофореза 2% (3%; 5%) – 50,0; 100,0; 200,0; 400,0
11. **Натрия бромид** раствор для электрофореза 3% (5%) – 50,0; 100,0; 200,0; 400,0
12. **Натрия гидрокарбоната** раствор для ингаляций 1% (2%; 3%; 5%) - 10,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
13. **Натрия тиосульфата** раствор для электрофореза 3% - 200,0
14. **Натрия хлорида** раствор для ингаляций 0,9% - 150,0 (300,0)
15. **Натрия хлорида** раствор для ингаляций 5% - 200,0 (400,0)

16. **Новокаина** раствор для электрофореза 0,5% (1%; 3%; 4%; 5%) - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
17. **Папаверина гидрохлорида** раствор для электрофореза 0,1% (0,5%; 1%; 2%; 2,5%; 5%) – 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
18. **Пиридоксина гидрохлорида** раствор для электрофореза 5% - 50,0
19. **Эуфиллина** раствор для электрофореза 0,5% (1%; 2%; 2,4%; 3%) – 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
20. **Раствор для ингаляций:**
 Натрия гидрокарбоната 4,1
 Натрия хлорида 4,0
 Калия йодида 4,0
 Воды очищенной 400,0
21. **Раствор для ингаляций:**
 Кальция хлорида 1,6
 Димедрола 0,05
 Кислоты аскорбиновой 3,2
 Воды очищенной 400,0
22. **Раствор для ингаляций**
 Раствор натрия хлорида 0,9%-400,0
 Димедрола 3,0
 Кислоты аскорбиновой 3,0
23. **Раствор для ингаляций**
 Эуфиллина 0,38
 Димедрола 0,04
 Новокаина 0,04
 Воды очищенной 400,0

4. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.

Лекарственные формы для ЛОР-практики

1. **Водорода перекиси** раствор 1% (2%) - 10,0; 20,0; 30,0; 150,0; 200,0; 400,0 (для обработки полости рта)
2. **Димедрола** раствор 0,5% - 10,0 (капли в нос)

3. **Йода** раствор (раствор Люголя водный)
Йода 1,0 (2,0)
Калия йодида 2,0(4,0)
Воды очищенной до 100,0 (200,0)
4. **Колларгола** раствор 2% - 10,0 (капли в нос)
5. **Кислоты аминакапроновой** мазь 5% - 50,0 (100,0) (асептически, кровоостанавливающее средство)
6. **Колларгола** раствор 5% - 10,0 (асептически, для прижигания в ЛОР - кабинет)
7. **Левомецетина** 10,0 (порошок для турундочек в ухо)
8. **Левомецетина** раствор спиртовой 2% - 2,0 (капли в ухо)
9. **Протаргола** раствор 1% (2%; 3%; 4%) -10,0; 30,0 (капли в нос)
10. **Фурацилина** раствор 1:5000 (0,02%) - 50,0
11. **Фурацилина** раствор стерильный 1:5000 (0,02%) - 50,0
12. **Фурацилина** раствор спиртовой 0,066% - 2,0 (капли в ухо)
Фурацилина 0,066 г
Спирта этилового 90% - 100,0
13. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,05%-100,0; 200,0; 400,0
14. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,02 % - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0
15. **Капли в нос**
Фурацилина 0,003
Димедрола 0,05
Раствора стрептоцида растворимого 0,8%-15,0
16. **Капли в ухо:**
Новокаина 0,1
Спирта этилового 70%
Глицерина поровну по 7,5
17. **Мазь в нос:**
Ментола 0,45
Протаргола 0,2
Димедрола 1,2
Ланолина 15,0
Вазелина 30,0

18. Мазь в нос:

Димедрола 0,05
Протаргола 0,4
Ментола 0,2
Масла вазелинового 4,0
Вазелина 16,0

19. Мазь в нос:

Ментола 0,1
Димедрола 0,1
Кислоты борной 0,3
Ланолина 3,0
Вазелина 7,0

20. Мазь в нос:

Ментола 0,15
Димедрола 0,15
Протаргола 0,4
Глицерина 6,0
Вазелина 19,0

21. Мазь в нос:

Ментола 0,05
Димедрола 0,03
Протаргола 0,4
Стрептоцида 0,4
Ланолина 2,0
Вазелина 23,6

22. Мазь в нос:

Димедрола 0,05
Новокаина 0,3
Ланолина 10,0
Вазелина 10,0

5. СТОМАТОЛОГИЯ

1. **Водорода перекиси** раствор 1% (2%) - 10,0; 20,0; 30,0; 150,0; 200,0; 400,0 (для обработки полости рта)
2. **Калия йодида** раствор 3% - 50,0 (для электрофореза)

3. **Калия перманганата** растворы для СПИД-аптечки
 Калия перманганата раствор 0,05% - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
 Калия перманганата раствор 0,01% - 10,0
4. **Кальция хлорида** раствор 10% - 50,0 (для электрофореза)
5. **Кислоты никотиновой** раствор 1% - 50,0 (для электрофореза)
6. **Пиридоксина гидрохлорида** раствор 5% - 50,0 (для электрофореза)
7. **Фурацилина** раствор 1:5000 (0,02%) - 50,0
8. **Фурацилина** раствор стерильный 1:5000 (0,02%) - 50,0
9. **Хлоргексидина биглюконата** раствор 2% (3%) - 10,0; 100,0; 200,0; 400,0 (для прижиганий в стоматологии)
10. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,05%-100,0; 200,0; 400,0
11. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,02 % - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0
12. **Цинка окиси** 5,0 (Порошок для стоматологических паст)

6. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ

Лекарственные формы для специального применения в акушерстве и гинекологии

1. **Ихтиола** раствор для тампонов 2% (3%; 5%) - 100,0; 150,0; 200,0
2. **Йода** раствор водный для кольпоскопии:
 Йода 1,5 (3,0)
 Калия йодида 3,0 (4,0)
 Воды очищенной 100,0 (300,0)
3. **Йода** раствор водный (раствор Люголя водный) для кольпоскопии:
 Йода 1,0 (2,0)
 Калия йодида 2,0 (4,0)
 Воды очищенной до 100,0 (200,0)
4. **Натрия тетрабората** раствор глицериновый 10% - 50,0 (100,0) (для тампонов)

5. **Натрия тетрабората** раствор глицериновый 10% стерильный - 50,0 (100,0) (для тампонов)
6. **Натрия хлорида** раствор 4,5% (5%) - 100,0 (200,0) (для клизм)
7. **Натрия хлорида** раствор стерильный 20% - 200,0; 400,0 (для интраамнеального введения)
8. **Калия перманганата** раствор 0,01% (0,02%; 0,025%) - 50,0; 100,0; 200,0 (для наружной обработки гениталий)
9. **Кислоты борной** раствор стерильный 1% (2%) - 100,0 (для наружной обработки гениталий)
10. **Фурацилина** раствор стерильный 0,02% - 50,0 (для спринцеваний и промываний)
11. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,02 % - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0 (для местной санации нижних отделов генитального тракта)

7. УРОЛОГИЯ

Специальные лекарственные формы для урологии

1. **Калия перманганата** раствор 0,01% (0,02%; 0,025%) - 50,0; 100,0; 200,0 (для наружной обработки гениталий, спринцеваний и промываний)
2. **Кислоты борной** раствор стерильный 1% (2%) - 10,0; 100,0 (для промывания мочевыводящих путей)
3. **Кислоты борной** раствор стерильный 3% - 400,0 (для промывания мочевого пузыря)
4. **Колларгола** раствор 2% (3%) - 100,0; 200,0 (асептически, для инстилляций в мочевой пузырь)
5. **Протаргола** раствор 1% (2%) - 100,0; 200,0 (асептически, для инстилляций мочевого пузыря)
6. **Фурацилина** раствор стерильный 0,02% - 50,0 (для спринцеваний и промываний)

7. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,05%-100,0; 200,0; 400,0 (для обработки гениталий и промываний)

8. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,02 % - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0 (для обработки гениталий и промываний)

8. ХИРУРГИЯ

8.1. Стерильные и асептически изготавливаемые растворы для применения при хирургических манипуляциях

1. **Калия перманганата** раствор 1:8000 - 30,0; 50,0 (асептически, для обработки глаз и слизистых)
2. **Калия перманганата** раствор 0,5% - 10,0; 30,0; 50,0; 100,0; 200,0 (асептически, для обработки ран)
3. **Калия перманганата** раствор 1% - 200,0 (асептически, для обработки ран)
4. **Калия перманганата** раствор 2% (3%; 4%) - 200,0 (асептически, для обработки ран)
5. **Калия перманганата** раствор 5% - 10,0 (асептически, для обработки пуповины новорожденных); 30,0; 50,0; 100,0; 150,0; 200,0; 400,0 (для обработки ран, швов)
6. **Натрия хлорида** раствор стерильный 10% - 10,0; 50,0; 100,0; 180,0; 200,0 (для перевязок)
7. **Натрия хлорида** раствор стерильный 3% (4,5%; 5%) - 100,0; 200,0 (для клизм, для перевязок)
8. **Фурацилина** раствор стерильный 0,02% - 50,0
9. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,05%-100,0; 200,0; 400,0

10. **Хлоргексидина биглюконата** раствор стерильный 0,02 % - 10,0;
50,0; 100,0; 200,0; 400,0

8.2. Нестерильные антисептические растворы

1. **Аммиака** раствор 10%- 15,0 (для мытья рук хирургов: 15 мл на 3 л теплой воды)
2. **Бриллиантового зеленого** раствор 1% - 10,0
3. **Бриллиантового зеленого** раствор 2% - 50,0
4. **Водорода перекиси** раствор 3% - 60,0, 220,0, 400,0 (для детей, без стабилизаторов)
5. **Йода** раствор:
Йода 1,5 (3,0)
Калия йодида 3,0 (4,0)
Воды очищенной 100,0 (300,0)
6. **Йода** раствор (раствор Люголя водный)
Йода 1,0 (2,0)
Калия йодида 2,0(4,0)
Воды очищенной до 100,0 (200,0)
7. **Йода** раствор спиртовый 0,4% (0,8%) для наружного применения:
Йода 0,4 (0,8)
Спирта этилового 95%-100,0
8. **Йода** раствор спиртовый 1% - 10,0
Йода 0,1
Спирта этилового 96% - 10,0
9. **Йодопирона** раствор 1% - 200,0; 250,0
10. **Калия перманганата** раствор 0,01% (0,02%; 0,025%) - 50,0; 100,0;
200,0
11. **Калия перманганата** раствор для прижиганий 6% - 100,0
12. **Фурацилина** раствор 1:5000 (0,02%) – 50,0

13. **Хлоргексидина биглюконата** раствор 1%-400,0 (для обработки рук)

9. КАРДИОХИРУРГИЯ

Инфузионные растворы

1. Раствор инфузионный кардиоплегический № 1:

Калия хлорида 1,12
 Натрия хлорида 1,0
 Глюкозы 1,419
 Маннита 4,73
 Воды для инъекций 200,0

2. Раствор инфузионный кардиоплегический № 2:

Натрия гидрокарбоната 0,746
 Воды для инъекций 200,0

10. ДЕРМАТОЛОГИЯ

10.1. Водные растворы для наружного применения

1. **Бриллиантового зеленого** раствор 1% - 10,0
2. **Бриллиантового зеленого** раствор 2% - 50,0
3. **Калия перманганата** раствор для прижиганий 6% - 100,0

10.2. Глицериновые, спиртовые растворы, суспензии

1. **Натрия тетрабората** раствор глицериновый 10%-50,0 (100,0)
2. **Суспензия для наружного применения:**
 Стрептоцида 5,0
 Анестезина 5,0
 Метилурацила 0,5
 Рибофлавина 0,25
 Глицерина 100,0
3. **Суспензия для наружного применения:**
 Левомецетина 0,25
 Анестезина 0,15
 Глицерина 50,0

4. **Йода** раствор спиртовый 0,4% (0,8%) для наружного применения:
Йода 0,4 (0,8)
Спирта этилового 95%-100,0

5. **Йода** раствор спиртовый 1%-10,0
Йода 0,1
Спирта этилового 96% - 10,0

6. **Раствор спиртовый** для наружного применения
Кислоты салициловой 2,0
Резорцина 2,0
Спирта этилового 70%-50,0

10.3. Мази

1. **«Кольд –крем»**
Вазелина
Ланолина безводного
Глицерина
Воды очищенной поровну по 25,0

2. **Мазь анестезиновая** 5% (10%) - 50,0; 100,0

3. **Мазь димедроловая** 1%- 50,0;100,0; 750,0

4. **Мазь димедроловая** 5% - 100,0

5. **Мазь папавериновая** 5% - 100,0

6. **Мазь салициловая** 3% - 100,0

7. **Мазь салициловая** 10% - 50,0; 100,0

8. **Мазь салициловая** 24%-100.0

9. **Мазь салициловая** 30% 100,0

10. **Мазь салициловая** 40%-50,0; 100,0

11. **Мазь стрептоцидовая** 5% -100,0

12. **Мазь:**
Серы 5,0 (10,0; 20,0; 33,0)
Ланолина безводного
Вазелина
Воды поровну до 100,0

13. **Мазь:**

Кислоты борной 2,0 (0,3)

Стрептоцида 5,0 (0,6)

Мази цинковой 100,0 (30,0)

14. **Мазь с АСД:**

АСД III фракция 1,0

Мазь цинковая 10% 50,0

Ланолин 50,0

15. **Мазь:**

Мази цинковой 100,0

Левомецетина 10,0

16. **Мазь:**

Левомецетина 1,0

Анестезина 7,5

Вазелина до 100,0

17. **Мазь:**

Фурацилина 0,33

Анестезина 0,33

Левомецетина 0,33

Ланолина 20,0

Вазелина 80,0

11. ТЕРАПИЯ

Лекарственные формы аптечного изготовления, применяющиеся в отделениях терапевтического профиля

11.1. Лекарственные формы для внутреннего применения

1. **Глюкозы** 20,0 (75,0; 100,0) (порошок глюкозы для исследования «сахарной кривой»; перед применением растворяют в теплой воде при перемешивании).
2. **Глюкозы** раствор 25%-50,0 (для сахарной кривой)
3. **Калия хлорида** 1,0 порошки №50 (№60) (запивать водой)

4. **Кальция хлорида** раствор 5% - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0
5. **Кислоты аминкапроновой** 0,5 (1,0; 3,0) порошки №250 (№30)
6. **Магния сульфата** раствор для дюбажа 12,5% - 200,0
7. **Магния сульфата** раствор стерильный для дуоденального зондирования 25% (33%) -100; 200,0; 400,0
8. ***Микстура отхаркивающая:***
 Экстракта корней алтея
 Натрия гидрокарбоната
 Натрия бензоата
 Нашатырно-анисовых капель
 Грудного эликсира поровну по 2,0 (4,0)
 Воды очищенной 100,0 (200,0)
9. ***Микстура отхаркивающая:***
 Экстракта корней алтея
 Натрия гидрокарбоната
 Натрия бензоата
 Грудного эликсира поровну по 2,0 (4,0)
 Воды очищенной 200,0
10. ***Микстура отхаркивающая:***
 Экстракта корней алтея 2,0
 Натрия гидрокарбоната 3,0
 Воды очищенной 100,0
11. ***Микстура отхаркивающая:***
 Экстракта корней алтея 6,0
 Натрия гидрокарбоната 3,0
 Воды очищенной 300,0
12. ***Микстура отхаркивающая:***
 Настоя травы термопсиса из 0,5-200,0
 Натрия гидрокарбоната
 Натрия бензоата
 Грудного эликсира поровну по 4,0
13. ***Микстура Павлова (седативная)***
 Натрия бромиды 1,0
 Кофеина-бензоата натрия 0,5
 Воды очищенной 200,0
14. **Натрия хлорида** раствор для клизм 1% (2%) -200,0
15. **Натрия хлорида** раствор для клизм 4,5% (5%) - 100,0; 200,0

16. **Спирт этиловый 50% - 50,0** (для компрессов)

17. **Порошки «Антигриппин»:**

Димедрола 0,02

Анальгина 0,5

Кальция глюконата 0,2

Кислоты аскорбиновой 0,3

№25

18. **Порошки «Антигриппин»:**

Димедрола 0,03

Анальгина 0,3

Кальция глюконата 0,25

Кислоты аскорбиновой 0,3

№25

19. **Порошки «Антигриппин»:**

Димедрола

Рутина поровну по 0,02

Анальгина

Кальция глюконата поровну по 0,25

Кислоты аскорбиновой 0,3

№10

20. **Порошки «Антигриппин»:**

Димедрола

Рутина поровну по 0,02

Анальгина

Кальция глюконата

Кислоты аскорбиновой поровну по 0,3

№20

21. **Порошки «Антигриппин»:**

Димедрола 0,01 (0,02)

Анальгина

Кальция глюконата

Кислоты аскорбиновой поровну по 0,2

№10

22. **Порошки «Антигриппин»:**

Димедрола 0,015

Анальгина 0,2

Кальция глюконата

Кислоты аскорбиновой поровну по 0,1

№10

23. Порошки «Антигриппин»:

Димедрола 0,02
Анальгина 0,5
Кальция глюконата 0,1
Кислоты аскорбиновой 0,3
№10

24. Порошки «Антигриппин»:

Димедрола 0,02
Анальгина
Кальция глюконата
Кислоты аскорбиновой поровну по 0,3
№ 10

25. Порошки «Антигриппин»:

Димедрола
Рутин поровну по 0,01
Анальгина 0,2
Кальция глюконата 0,1
Кислоты аскорбиновой 0,3
№20

26. Порошки «Антигриппин»:

Димедрола 0,002
Рутин 0,02
Кислоты ацетилсалициловой 0,5
Кальция глюконата 0,1
Кислоты аскорбиновой 0,3
№20

27. Порошки «Антигриппин»:

Димедрола 0,02
Рутин 0,02
Кислоты ацетилсалициловой 0,5
Кальция глюконата 0,1
Кислоты аскорбиновой 0,3
№ 10

28. Порошки «Антигриппин»:

Димедрола 0,02
Кислоты ацетилсалициловой 0,25
Кальция глюконата 0,1
Кислоты аскорбиновой 0,2
№ 10

11.2. Лекарственные формы для местного и наружного применения

1. **Глицерин** 10,0 стерильный (для смазывания оливы при дуоденальном зондировании)
2. **Глицерин** 10,0 (для смазывания оливы при дуоденальном зондировании)
3. **Фурацилина** раствор стерильный 0,02% - 50,0 (для полоскания горла)
4. **Фурацилина** раствор 0,02% - 50,0 (для полоскания горла)

11.3. Инъекционные растворы

1. **Калия хлорида** раствор 4% - 50,0; 100,0 для инъекций (внутривенно)
2. **Кальция хлорида** раствор 1% - 100,0 для инъекций (внутривенно)
3. **Натрия хлорида** раствор 0,45% - 200,0; 400,0 для инъекций (внутривенно)
4. **Натрия хлорида** раствор 10% - 50,0 (100,0) для инъекций (внутривенно)

Часть II. Прописи лекарственных препаратов аптечного изготовления по видам лекарственных форм

1. Водные растворы для наружного применения

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Раствор аммиака 10%- 15,0	Для мытья рук хирургов (25 мл на 5 л теплой воды)	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов в данной фасовке. Обеспечение точности дозирования – для приготовления 3 л раствора
2	Раствор бриллиантового зеленого 1% - 10,0	Антисептическое средство. Для обработки повреждений кожи.	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
3	Раствор бриллиантового зеленого 2% - 50,0	Антисептическое средство. Для обработки повреждений кожи.	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
4	Раствор водорода перекиси 2%-10,0	Антисептическое средство. Для обработки полости рта	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизатор бензоат натрия. Однородная упаковка.
5	Раствор Люголя водный: Йода 1,0 (2,0) Калия йодида 2,0(4,0) Воды очищенной до 100,0 (200,0)	Антисептическое средство для смазывания кожи и слизистых оболочек	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
6	Йода 1,5 Калия йодида 3,0 Воды очищенной 100,0	Антисептическое средство для смазывания кожи и слизистых оболочек	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов

1	2	3	4	5	6
7	Йода 3,0 Калия йодида 4,0 Воды 300,0	Антисептическое средство для смазывания кожи и слизистых оболочек	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
8	Фурацилина 0,003 Димедрола 0,05 Раствора стрептоцида растворимого 0,8%-15,0	Капли в нос. Противоаллергическое, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
9	Раствора дибазола 1%- 200,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
10	Раствора димедрола 0,5% (1%) – 30,0; 50,0; 200,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
11	Раствора димедрола 0,5% - 10,0	Капли в нос. Противоаллергическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
12	Димексида 25,0 Воды очищенной 100,0	Раствор для компрессов. Противовоспалительное, анальгезирующее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
13	Раствора йодопирона 1% - 200,0; 250,0	Антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
14	Раствора ихтиола 2% (3%; 5%) - 100,0; 150,0; 200,0	Раствор для примочек и тампонов. Антисептическое, противовоспалительное средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
15	Раствора ихтиола 5%- 200,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
16	Раствора калия йодида 1% (2%; 3%; 5%) – 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов

1	2	3	4	5	6
17	Раствор калия перманганата 0,01% (0,02%; 0,025%) - 50,0; 100,0; 200,0	Антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
18	Раствор калия перманганата 0,05% - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Антисептическое средство. Раствор для СПИД-аптечки.	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
19	Раствор для прижиганий Раствор калия перманганата 6%-100,0	Антисептическое средство. Для прижиганий.	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
20	Раствор кальция хлорида 1% (5%, 10%) - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Оптимальная фасовка
21	Раствор кислоты аскорбиновой 1% (2%; 5%) - 50,0; 100,0; 200,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
22	Раствор кислоты никотиновой 1%-50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
23	Раствор колларгола 2% - 10,0	Капли в нос. Антисептическое средство.	30 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов
24	Раствор кофеина-бензоата натрия 1% - 50,0; 100,0; 200,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
25	Раствор магния сульфата 2% (3%; 5%) - 50,0; 100,0; 200,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Оптимальная фасовка
26	Раствор натрия бромида 3% (5%) - 50,0; 100,0; 200,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Оптимальная фасовка

1	2	3	4	5	6
27	Раствор натрия гидрокарбоната 1% (2%; 3%; 5%) - 10,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
28	Раствор тиосульфата натрия 3%-200,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
29	Раствор натрия хлорида 1% (2%; 3%) -200,0	Раствор для клизм	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
30	Раствора натрия хлорида 4,5% (5%) - 100,0; 200,0	Раствор для клизм	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
31	Раствор натрия хлорида 5%-200,0; 400,0	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
32	Раствор новокаина 0,5% (1%; 2%; 3%; 4%; 5%) -50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
33	Раствор папаверина гидрохлорида 0,1% (0,5%; 1%; 2%; 2,5%; 5%) - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит стабилизаторов
34	Раствор перекиси водорода 1% (2%)- 20,0; 30,0; 150,0; 200,0; 400,0	Антисептический раствор для обработки слизистых в стоматологии	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит бензоат натрия
35	Раствора пиридоксина гидрохлорида 5% - 50,0	Раствор для электрофореза	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
36	Раствора перекиси водорода 3% - 60,0,220,0, 400,0	Антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит бензоат натрия

1	2	3	4	5	6
37	Раствор протаргола 1% (2%; 3%; 4%) - 10,0; 30,0	Капли в нос	Для 1%, 3%, 4% - 10 суток, для 2% - 30 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
38	Раствора фурацилина 1:5000 (0,02%) - 50,0	Антисептический раствор для полоскания горла и обработки полости рта	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов в данной фасовке. Индивидуальная фасовка
39	Раствор хлоргексидина биглюконата 2% (3%) - 10,0; 100,0; 200,0; 400,0	Раствор для прижиганий в стоматологии	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
40	Раствор эуфиллина 0,5% (1%; 2%; 2,4%; 3%) - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Раствор для электрофореза:	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Не содержит вспомогательных веществ.
41	Натрия гидрокарбоната 4,1 Натрия хлорида 4,0 Калия йодида 4,0 Воды очищенной 400,0	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
42	Кальция хлорида 1,6 Димедрола 0,05 Кислоты аскорбиновой 3,2 Воды очищенной 400,0	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
43	Эуфиллина 0,38 Димедрола 0,04 Новокаина 0,04 Воды очищенной 400,0	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
44	Раствор натрия хлорида 0,9% - 150,0 (300,0)	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
45	Раствор натрия хлорида 0,9%-400,0 Димедрола 3,0 Кислоты аскорбиновой 3,0	Раствор для ингаляций	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.

2. Водные растворы, микстуры для внутреннего применения

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Раствор глюкозы 25%-50,0	Для сахарной кривой	1 сутки	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
2	Раствор кислоты аскорбиновой 1% - 50,0; 100,0; 200,0	Витаминное средство.	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
3	Раствор магния сульфата 2% (5%) - 100,0; 200,0; 400,0	Седативное, спазмолитическое средство	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
4	Раствор магния сульфата 12,5%-200,0	Раствор для дюбажа. Спазмолитическое, желчегонное, слабительное средство	15 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
5	Раствор кальция хлорида 5% - 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 400,0	Средство, уменьшающее проницаемость сосудистой стенки. При аллергии.	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
6	Раствор натрия хлорида 1%-200,0	Средство для регидратации	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
7	Раствор калия иодида 10%-200,0	Раствор для внутреннего применения при актинномикозе легких	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
8	Раствора глюкозы 4%-200,0 Рибофлавина Тиамин хлорида поровну по 0,02 Кислоты аскорбиновой 2,0	Витаминное средство.	1 сутки	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов

1	2	3	4	5	6
9	Раствора глюкозы 4%-200,0 Тиамин хлорида Пиридоксина гидрохлорида поровну по 0,04 Кислоты аскорбиновой 2,0	Витаминное средство.	1 сутки	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
10	Раствора глюкозы 10%-200,0 Магния сульфата 2,0 Настойки валерианы 2,0	Седативное, спазмолитическое средство	1 сутки	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
11	Натрия бромида 1,0 Кофеина-бензоата натрия 0,5 Воды очищенной 200,0	Микстура Павлова. Седативное средство. В лечении неврозов и неврастении, связанных со слабостью тормозного и возбуждательного процессов.	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
12	Экстракта корней алтея Натрия гидрокарбоната Натрия бензоата Нашатырно-анисовых капель Грудного эликсира поровну по 2,0 (4,0) Воды очищенной 100,0 (200,0)	Микстура отхаркивающая	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
13	Экстракта корней алтея Натрия гидрокарбоната Натрия бензоата Грудного эликсира поровну по 2,0 Воды очищенной 200,0	Микстура отхаркивающая	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
14	Экстракта корней алтея сухого Натрия гидрокарбоната Натрия бензоата Грудного эликсира поровну по 4,0 Воды очищенной 200,0	Микстура отхаркивающая	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов

1	2	3	4	5	6
15	Экстракта корней алтея 2,0 Натрия гидрокарбоната 3,0 Воды очищенной 100,0	Микстура отхаркивающая	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов
16	Экстракта корней алтея 6,0 Натрия гидрокарбоната 3,0 Воды очищенной 300,0	Микстура отхаркивающая	10 суток	внутреннее	Отсутствие в составе консервантов. Отсутствие промышленных аналогов

3. Неводные растворы

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	стерильное/внутреннее/наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Глицерин 10,0	Для смазывания оливы при дуоденальном зондировании	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов в данной фасовке. Фасовка для одноразового применения.
2	Глицерин 10,0 (стерильно)	Для смазывания оливы при дуоденальном зондировании	30 суток	наружное/стерильное	Отсутствие промышленных аналогов.
3	Йода 0,4 (0,8) Спирта этилового 95%-100,0	Антисептическое средство	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
4	Йода раствор спиртовый 1%-10,0	Антисептическое средство	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
5	Новокаина 0,1 Спирта этилового 70% Глицерина поровну по 7,5	Капли в ухо Местноанестезирующее, антисептическое средство	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
6	Раствор левомицетина спиртовый 2% - 2,0	Капли в ухо. Противомикробное средство	10 суток	наружное	Индивидуальная упаковка

1	2	3	4	5	6
10	Раствор натрия тетрабората глицериновый 10%-50,0 (100,0)	Антисептическое средство для кожи и слизистых	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов
11	Раствор натрия тетрабората глицериновый 10%-50,0 (100,0) стерильный	Антисептическое средство для кожи и слизистых	30 суток	Наружное/ стерильное	Отсутствие промышленных аналогов
12	Раствор фурацилина спиртовой 0,066%-2,0	Капли в ухо. Антисептическое средство	10 суток	наружное	Индивидуальная упаковка
13	Кислоты салициловой 2,0 Резорцина 2,0 Спирта этилового 70%-50,0	Антисептическое средство	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
14	Спирт этиловый 50% - 50,0	Для компрессов	10 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов.

4. Суспензии для наружного применения

№ № п/ п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	Стрептоцида 5,0 Анестезина 5,0 Метилурацила 0,5 Рибофлавина 0,25 Глицерина 100,0	Суспензия для наружного применения. Ранозаживляющее, местноанестезирующее, противомикробное, смягчающее средство	3 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
2	Левомецитина 0,25 Анестезина 0,15 Глицерина 50,0	Суспензия для наружного применения. Местноанестезирующее, противомикробное, смягчающее средство	3 суток	наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ

5. Порошки

5.1. Порошки для внутреннего применения

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Глюкоза 20,0 (75,0; 100,0)	Порошки глюкозы для исследования «сахарной кривой»	10 суток	Внутреннее. Растворяют в теплой воде	Отсутствие аналогов промышленных
2	Дибазола 0,001 (0,002) Глюкозы 0,2 №50	Спазмолитическое, иммуномодулирующее средство.	10 суток	Внутреннее	Отсутствие аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
3	Димедрола Рутин порошку по 0,02 Анальгина Кальция глюконата порошку по 0,25 Кислоты аскорбиновой 0,3 №10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
4	Димедрола Рутин порошку по 0,02 Анальгина Кальция глюконата Кислоты аскорбиновой порошку по 0,3 №20	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ

1	2	3	4	5	6
5	Димедрола 0,01 (0,02) Анальгина Кальция глюконата Кислоты аскорбиновой поровну по 0,2 №10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
6	Димедрола 0,015 Анальгина 0,2 Кальция глюконата Кислоты аскорбиновой поровну по 0,1 №10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
7	Димедрола 0,02 Анальгина Кальция глюконата Кислоты аскорбиновой поровну по 0,3 № 10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
8	Димедрола Рутин поровну по 0,01 Анальгина 0,2 Кальция глюконата 0,1 Кислоты аскорбиновой 0,3 №20	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
9	Димедрола 0,03 Анальгина 0,3 Кальция глюконата 0,25 Кислоты аскорбиновой 0,3 №10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ

1	2	3	4	5	6
10	Димедрола 0,02 Анальгина 0,5 Кальция глюконата 0,2 Кислоты аскорбиновой 0,3 №25	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
11	Димедрола 0,02 Анальгина 0,5 Кальция глюконата 0,1 Кислоты аскорбиновой 0,3 №10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
12	Димедрола 0,002 Рутина 0,02 Кислоты ацетилсалициловой 0,5 Кальция глюконата 0,1 Кислоты аскорбиновой 0,3 №20	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
13	Димедрола 0,02 Рутина 0,02 Кислоты ацетилсалициловой 0,5 Кальция глюконата 0,1 Кислоты аскорбиновой 0,3 № 10	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
14	Димедрола 0,02 Кислоты ацетилсалициловой 0,25 Кальция глюконата 0,1 Кислоты аскорбиновой 0,2	«Антигриппин»	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ

1	2	3	4	5	6
15	Димедрола 0,01 Анальгина 0,2 Кислоты аскорбиновой 0,1 Глюкозы 0,2 № 10	«Антигриппин» детский	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
16	Димедрола 0,005 Анальгина 0,02 Кальция глюконата Кислоты аскорбиновой поровну по 0,05 Глюкозы 0,1 (0,2) №10	«Антигриппин» детский	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
17	Димедрола 0,005 Рутина 0,01 Анальгина 0,02 Кальция глюконата Кислоты аскорбиновой поровну по 0,1 №20	«Антигриппин» детский	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
18	Калия хлорида 1,0 №50 (№60)	Средство для восстановления уровня калия в организме	10 суток	Внутреннее. Особенности применения: запивать водой	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
19	Кальция глюконата 0,2 №30	Противоаллергическое, восполняющее дефицит кальция средство	10 суток	Внутреннее.	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
20	Кислоты аминакапроновой 0,5 (1,0; 3,0) №250 №30	Кровоостанавливающее средство	10 суток	Внутреннее.	Отсутствие промышленных аналогов.

1	2	3	4	5	6
21	Кислоты аскорбиновой 0,01 (0,05) Глюкозы 0,2 №30 (№25, №50)	Витаминное средство	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
22	Кислоты фолиевой 0,00005 Глюкозы 0,2 №50	Средство, стимулирующее кроветворение	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
23	Кофеина-бензоата натрия 0,2 №30	Психостимулирующее средство	10 суток	Внутреннее.	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
24	Пиридоксина гидрохлорида 0,01 Глюкозы 0,2 №30	Витаминное средство	10 суток	Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
25	Эуфиллина 0,005 Кальция глюконата 0,2 №30	Порошки детские. Спазмолитическое, вазодилатирующее, бронходилатирующее, диуретическое средство	10 суток	Внутреннее.	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
26	Фенобарбитала 0,003 (0,005) Глюкозы 0,2 №20 (№30; №50; №60; №120)	Порошки Противоэпилептическое средство	10 суток 30 суток	Внутреннее. Изготовлено асептически/ Внутреннее	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ

5.2. Порошки для наружного применения

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	Левомицетина 10,0	Порошок для турундочек в ухо. Противомикробное средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ
2	Цинка окиси 5,0	Порошок для стоматологических паст	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов и других вспомогательных веществ

6. Мази

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Ланолина безводного Масла подсолнечного Воды очищенной поровну по 100,0	Мазевая основа Смягчающее средство	5 суток	Наружное	Ингредиенты природного происхождения. Отсутствие консервантов. Отсутствие аналогов промышленного производства
2	Ланолина безводного Вазелина Воды очищенной поровну по 100,0	Мазевая основа Смягчающее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие консервантов. Отсутствие аналогов промышленного производства

1	2	3	4	5	6
3	Вазелина Ланолина безводного Глицерина Воды очищенной поровну по 25,0	«Кольд - крем» Мазевая основа Смягчающее, увлажняющее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие консервантов. Отсутствие аналогов промышленного производства
4	Мазь кислоты аминакапроновой 5%-50,0; 100,0	Для использования в ЛОР-практике при операциях. Кровоостанавливающее средство	2 суток	Наружное / Изготовлено асептически	Отсутствие консервантов. Отсутствие аналогов промышленного производства
5	Мазь анестезиновая 5% (10%) - 50,0; 100,0	Местноанестезирующее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
6	Мазь димедроловая 1%-50,0; 100,0; 750,0 Мазь димедроловая 5% - 100,0	Противоаллергическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
7	Мазь папавериновая 5% - 100,0	При кожных заболеваниях	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов.
8	Мазь салициловая 10% - 50,0; 100,0 Мазь салициловая 24%-100,0 Мазь салициловая 30% 100,0 Мазь салициловая 40%-50,0; 100,0	Кератолитическое, антисептическое средство для взрослых - для нанесения на струпы при ожогах и отморожениях	10 суток 2 суток	Наружное Наружное / Изготовлено асептически	Отсутствие промышленных аналогов.
9	Серы 5,0 (10,0) Ланолина безводного Вазелина Воды поровну до 100,0	Противосеборейное, противопаразитарное, антисептическое средство для детей	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов на данной основе
10	Серы 20,0 (33,0) Ланолина безводного Вазелина Воды поровну до 100,0	Противосеборейное, противопаразитарное, антисептическое средство для взрослых	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов на данной основе
11	Мазь стрептоцидовая 5% -100,0	Противомикробное средство	10 суток	Наружное	Отсутствие промышленных аналогов в данной концентрации

1	2	3	4	5	6
12	Мазь: Кислоты борной 2,0 (0,3) Стрептоцида 5,0 (0,6) Мази цинковой 100,0 (30,0)	Подсушивающее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов промышленных
13	Мазь: Мази цинковой 100,0 Левометицина 10,0	Подсушивающее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов промышленных
14	Мазь с АСД: АСД III фракция 1,0 Мазь цинковая 10% 50,0 Ланолин 50,0	Ранозаживляющее, подсушивающее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов промышленных
20	Мазь: Левометицина 1,0 Анестезина 7,5 Вазелина до 100,0	Противомикробное, местноанестезирующее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов промышленных
21	Мазь в нос: Димедрола 0,05 Протаргола 0,4 Ментола 0,2 Масла вазелинового 4,0 Вазелина 16,0	Противоаллергическое, местноанестезирующее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов промышленных
22	Мазь в нос: Ментола 0,45 Протаргола 0,2 Димедрола 1,2 Ланолина 15,0 Вазелина 30,0	Противоаллергическое, местноанестезирующее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов промышленных

1	2	3	4	5	6
23	Мазь в нос: Димедрола 0,05 Новокаина 0,3 Ланолина 10,0 Вазелина 10,0	Противоаллергическое, местноанестезирующее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов
24	Мазь в нос: Ментола 0,1 Димедрола 0,1 Кислоты борной 0,3 Ланолина 3,0 Вазелина 7,0	Противоаллергическое, местноанестезирующее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов
25	Мазь в нос: Ментола 0,15 Димедрола 0,15 Протаргола 0,4 Глицерина 6,0 Вазелина 19,0	Противоаллергическое, местноанестезирующее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов
26	Мазь в нос: Ментола 0,05 Димедрола 0,03 Протаргола 0,4 Стрептоцида 0,4 Ланолина 2,0 Вазелина 23,6	Противоаллергическое, местноанестезирующее, антисептическое средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов
27	Мазь: Фурацилина 0,33 Анестезина 0,33 Левомицетина 0,33 Ланолина 20,0 Вазелина 80,0	Антисептическое, местноанестезирующее средство	10 суток	Наружное	Отсутствие аналогов

7. Стерильные растворы для внутреннего применения

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Вода очищенная стерильная для внутреннего применения - 10,0	Для допаивания новорожденных	30 суток	Внутреннее, стерильно	Отсутствие промышленных аналогов во флаконах. Одноразовая фасовка.
2	Вода очищенная стерильная для внутреннего применения - 100,0; 200,0	Для разведения сухой смеси для детского питания	30 суток	Внутреннее, стерильно	Отсутствие промышленных аналогов
3	Раствор глюкозы стерильный для внутреннего применения 5% (25%)- 10,0	Для допаивания новорожденных	30 суток	Внутреннее, стерильно	Не содержит стабилизаторов, создающих кислую среду. Отсутствие промышленных аналогов во флаконах. Одноразовая фасовка.
4	Раствор магния сульфата стерильный 12,5%-50,0; 100,0; 200,0	Для дробажа	30 суток	Внутреннее, стерильно	Отсутствие промышленных аналогов
5	Раствор магния сульфата стерильный 25% (33%) - 100,0; 200,0; 400,0	Для дуоденального зондирования	30 суток	Внутреннее, стерильно	Отсутствие промышленных аналогов
6	Раствор эуфиллина 0,5%- 50,0 Стерильно!	Раствор для приема внутрь детям. Спазмолитическое, вазодилатирующее, бронходилатирующее, диуретическое средство	30 суток	Внутреннее, стерильно	Отсутствие промышленных аналогов

8. Стерильные и асептически изготовленные растворы, масла для наружного применения

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Вода очищенная стерильная - 50,0; 100,0; 150,0; 180,0; 200,0; 400,0	Для обработки эндоскопов	30 суток	Стерильное/ наружное	Отсутствие аналогов
2	Вода очищенная стерильная - 200,0	Для обработки аппарата искусственной вентиляции легких	30 суток	Стерильное/ наружное	Отсутствие аналогов
3	Вода очищенная стерильная - 400,0	Для обработки кювезов новорожденных	30 суток	Стерильное/ наружное	Отсутствие аналогов
4	Глицерин 10,0 (стерильно)	Для смазывания оливы при дуоденальном зондировании	30 суток	Стерильное/ наружное	Индивидуальная фасовка Отсутствие аналогов
5	Раствор натрия гидрокарбоната стерильный 3%- 100,0	Для обработки кожи новорожденных	30 суток	Стерильное/ наружное	Отсутствие аналогов
6	Раствор борной кислоты стерильный 3% - 400,0	Для промывания мочевого пузыря. Антисептическое средство	30 суток	Для местного применения, стерильно	Отсутствие аналогов
7	Раствор борной кислоты стерильный для наружного применения 1% (2%) - 10,0; 100,0	Для обработки кожи. Антисептическое средство	30 суток	Стерильное/ наружное	Отсутствие аналогов
8	Раствор водорода перекиси 3%-8,0 (10,0)	Для обработки пуловины новорожденных. Антисептическое средство	15 суток	Наружное, изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Не содержит стабилизатор натрия бензоат. Отсутствие аналогов

1	2	3	4	5	6
9	Раствор водорода перекиси 3%- 30,0; 55,0; 60,0; 70,0; 95,0; 120,0; 150,0; 180,0; 190,0; 250,0 ; 300,0 ; 350,0	Для обработки ран. Антисептическое средство	15 суток	Наружное, изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
10	Раствора ихтиола 5%-200,0	Для тампонов. Антисептическое, противовоспалительное средство	2 суток	Для местного применения, изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
11	Раствор калия перманганата 0,5% - 10,0; 30,0; 50,0; 100,0; 200,0	Для обработки ран. Антисептическое средство	2 суток	Наружное. Изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
12	Раствор калия перманганата 1% (2%; 3%; 4%) - 200,0	Для обработки ран. Антисептическое средство	2 суток	Наружное. Изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
13	Раствор калия перманганата 5%- 30,0 ; 50,0 ; 100,0; 150,0; 200,0 ; 400,0	Для обработки ран, швов. Антисептическое, прижигающее средство	2 суток	Наружное. Изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
14	Раствор калия перманганата 5%- 10,0	Для обработки пуговины новорожденных. Антисептическое, прижигающее средство	2 суток	Наружное. асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
15	Раствор калия перманганата 0,01% - 10,0	Антисептическое средство. Раствор для СПИД-аптечки – для постэкспозиционной обработки глаз	2 суток	Наружное. Изготовлено асептически	Отсутствие промышленных аналогов
16	Раствор колларгола 5% - 10,0	Для прижигания в ЛОР-кабинет. Антисептическое, прижигающее средство	10 суток	Наружное. Изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов
17	Раствор колларгола 1% (2%; 3%) - 100,0; 200,0	Для инстилляции в мочевой пузырь. Антисептическое средство.	1%-2 суток 2% и 3% - 10 суток	Для местного применения. Изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие промышленных аналогов

1	2	3	4	5	6
18	Раствор натрия хлорида 3% стерильный - 50,0; 100,0	Для клизм	30 суток	Для местного применения. Стерильно	Отсутствие аналогов
19	Раствор натрия хлорида 3% (4,5%; 5%) стерильный - 100,0; 200,0	Для клизм, для перевязок	30 суток	Для местного применения. Стерильно	Отсутствие аналогов
20	Раствор натрия хлорида 10% стерильный для наружного применения - 10,0; 50,0; 100,0; 180,0; 200,0	Гипертонический раствор для перевязок	30 суток	Наружное. Стерильно	Отсутствие аналогов
21	Раствор натрия хлорида 20% стерильный для наружного применения - 200,0 ; 400,0	Гипертонический раствор для интраамнеального введения	30 суток	Для местного применения. Стерильно	Отсутствие аналогов
22	Раствор протаргола 1% (2%; 3%) - 100,0; 200,0	Для инстиляции в мочевой пузырь. Антисептическое средство.	10 суток	Для местного применения. Изготовлено асептически	Изготовлено асептически. Отсутствие аналогов
23	Раствор фурацилина стерильный 0,02% - 50,0	Антисептическое средство для наружного, местного и внутриместного применения	30 суток	Стерильное/наружное	Одноразовая фасовка. Отсутствие аналогов в данной фасовке
24	Раствор хлоргексидина биглюконата стерильный 0,05%-100,0; 200,0; 400,0	Антисептическое средство для наружного, местного и внутриместного применения	30 суток	Стерильное/наружное	Отсутствие аналогов
25	Раствор хлоргексидина биглюконата стерильный 0,02 % - 10,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0	Антисептическое средство для наружного, местного и внутриместного применения	30 суток	Стерильное/наружное	Отсутствие аналогов
26	Масло вазелиновое 5 г (10 г) стерильно	Для обработки кожи новорожденных. Смягчающее средство	30 суток	Стерильное/наружное	Отсутствие аналогов
27	Масло вазелиновое 25 г (30 г, 50 г) стерильно	Для обработки кожи новорожденных	30 суток	Стерильное/наружное	Отсутствие аналогов

9. Глазные лекарственные формы

№ № п/п	Состав	область и способ применения	Срок годности	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6
1	Вода очищенная стерильная 10,0	Для обработки глаз (в т.ч. у новорожденных)	30 суток	Стерильное/ глазное	Отсутствие промышленных аналогов во флаконах. Индивидуальная упаковка
2	Раствор глюкозы 20% - 10,0 (100,0)	Для глазных ванночек	30 суток	Стерильное/ глазное	Отсутствие промышленных аналогов во флаконах. Индивидуальная упаковка
3	Раствор натрия хлорида 0,9% - 10,0	Для обработки глаз	30 суток	Стерильное/ глазное	Отсутствие промышленных аналогов во флаконах. Отсутствие консервантов
4	Раствор натрия хлорида 10% - 10,0	Для обработки век	30 суток	Стерильное/ глазное	Отсутствие промышленных аналогов во флаконах. Отсутствие консервантов
5	Раствор калия перманганата 1:8000 (асептически, для обработки глаз) -30,0; 50,0	Для обработки глаз Антисептическое средство	2 суток	Изготовлено асептически, глазное	Отсутствие промышленных аналогов.
6	Раствор калия йодида 3%- 10,0	Глазные капли. Средство, регулирующее тканевый обмен	30 суток	Стерильное/ Глазные капли	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов
7	Раствор кальция хлорида 3% - 10,0	Глазные капли. Средство, регулирующее тканевый обмен	30 суток	Стерильное/ Глазные капли	Отсутствие промышленных аналогов. Отсутствие консервантов
8	Раствор кислоты борной 2% - 10,0; 100,0	Для промывания глаз. Антисептическое средство	30 суток	Стерильное/ Глазное	Отсутствие промышленных аналогов. Индивидуальная упаковка

1	2	3	4	5	6
9	Раствор колларгола 2% - 10,0	Глазные капли. Антибактериальное средство.	30 суток	Изготовлено асептически/Глазные капли	Отсутствие аналогов. консервантов
10	Раствор рибофлавина 0,02%-10,0	Глазные капли. Витаминное средство.	При темп. не выше 25 °С – 90 суток, при темп. 3-5 °С - 30 суток	Стерильное/Глазные капли	Отсутствие промышленных аналогов. консервантов
11	Раствор фурацилина 0,02% - 10,0	Глазные капли. Антисептическое средство.	30 суток	Стерильное/Глазные капли	Отсутствие промышленных аналогов. консервантов
12	Раствор хлоргексидина биглюконата 0,02% - 10,0	Для обработки Антисептическое средство.	30 суток	Стерильное/Глазные капли	Отсутствие промышленных аналогов. консервантов
13	«Витаминные» глазные капли Раствора рибофлавина 0,02%-10,0 Кислоты аскорбиновой 0,02 Натрия хлорида 0,05 Глюкозы 0,2	Глазные капли Витаминное средство	При темп. от 2 до 7 °С-7 суток, при темп. не выше 25 °С - 2 суток	Изготовлено асептически/Глазные капли	Отсутствие промышленных аналогов. консервантов
14	Колларгола 2,0 Воды очищенной 30 капель Глицерина 30 капель	Краска для тонометрии	2 суток	Изготовлено асептически	Отсутствие промышленных аналогов.
15	Колларгола 1,0 (2,0; 5,0) Воды очищенной 10 (20; 50) капель Глицерина 10 (20; 50) капель	Краска для тонометрии	2 суток	Изготовлено асептически	Отсутствие промышленных аналогов.
16	Раствор натрия тиосульфата 3%-200,0	Для обработки контактных линз	2 суток	Изготовлено асептически	Отсутствие промышленных аналогов. консервантов

10. Инъекционные растворы

№ № п/п	Состав	Область и способ применения	Срок годности	Срок использования после вскрытия упаковки	Стерильное/ внутреннее/ наружное	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7
1	Раствор калия хлорида для инъекций 4% - 50,0; 100,0	При гипокалиемии	30 суток	Одномоментно	Стерильно, для инъекций	Отсутствие промышленных аналогов
2	Раствор кальция хлорида для инъекций 1% - 100,0; 200,0	При гипокальциемии; противоаллергическое, кровоостанавливающее, противовоспалительное средство				Отсутствие промышленных аналогов
3	Раствор натрия хлорида 10% для инъекций – 50,0; 100,0	Гипертонический раствор	30 суток	Одномоментно	Стерильно, для инъекций	Отсутствие промышленных аналогов
4	Раствор натрия хлорида для инъекций 0,45% - 200,0; 400,0	Гипотонический раствор	30 суток	Одномоментно	Стерильно, для инъекций	Отсутствие промышленных аналогов
5	Раствор кардиоплегический № 1: калия хлорида 1,12 натрия хлорида 1,0 глюкозы 1,419 маннита 4,73 воды для инъекций 200,0	Для операций на сердце	30 суток	Одномоментно	Стерильно, для инъекций	Отсутствие промышленных аналогов
6	Раствор кардиоплегический № 2: натрия гидрокарбоната 0,746 воды для инъекций 200,0	Для операций на сердце	30 суток	Одномоментно	Стерильно, для инъекций	Отсутствие промышленных аналогов

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	3
Часть I. Прописи лекарственных препаратов аптечного изготовления по направлениям медицинской деятельности	6
1. ПЕДИАТРИЯ, НЕОНАТОЛОГИЯ. Специальные составы лекарственных форм аптечного изготовления для детей	6
1.1. Растворы, масла для наружного применения	6
1.2. Стерильные растворы для внутреннего применения	7
1.3. Растворы, микстуры для внутреннего применения	7
1.4. Порошки	8
2. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. Лекарственные формы для глаз	9
3. ФИЗИОТЕРАПИЯ. Растворы для электрофореза, компрессов и ингаляций	11
4. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. Лекарственные формы для ЛОР-практики	12
5. СТОМАТОЛОГИЯ	14
6. АКУШЕРСТВО. ГИНЕКОЛОГИЯ. Лекарственные формы для специального применения в акушерстве и гинекологии	15
7. УРОЛОГИЯ. Специальные лекарственные формы для урологии	16
8. ХИРУРГИЯ	17
8.1. Стерильные и асептически изготавливаемые растворы для применения при хирургических манипуляциях	17
8.2. Нестерильные антисептические растворы	18
9. КАРДИОХИРУРГИЯ. Инфузионные растворы	19
10. ДЕРМАТОЛОГИЯ	19
10.1. Водные растворы для наружного применения	19

10.2. Глицериновые, спиртовые растворы, суспензии	19
10.3. Мази	20
11. ТЕРАПИЯ. Лекарственные формы аптечного изготовления, применяющиеся в отделениях терапевтического профиля	21
11.1. Лекарственные формы для внутреннего применения	21
11.2. Лекарственные формы для местного и наружного применения	25
11.3. Инъекционные растворы	25
Часть II. Прописи лекарственных препаратов аптечного изготовления по видам лекарственных форм	26
1. Водные растворы для наружного применения	26
2. Водные растворы, микстуры для внутреннего применения	31
3. Неводные растворы	33
4. Суспензии для наружного применения	34
5. Порошки	35
5.1. Порошки для внутреннего применения	35
5.2. Порошки для наружного применения	40
6. Мази	41
7. Стерильные растворы для внутреннего применения	44
8. Стерильные и асептически изготовленные растворы, масла для наружного применения	45
9. Глазные лекарственные формы	42
10. Инъекционные растворы	50
СОДЕРЖАНИЕ	51